Bijlage B.

# LISTE DE MACROLÉPIDOPTÈRES

## NOUVEAUX POUR LA FAUNE DES PAYS-BAS,

COMMUNIQUÉS DANS LA

## SÉANCE DE LA SOC. ENT. NEÊRLANDAISE

## du 30 Juillet 1864.

Leucophasia Sinapis L. — Un individu a été pris, en 1862, à Bloemendaal, aux environs de Harlem. Il volait en compagnie de l'*Anthocharis Cardamines*, c'est-à-dire en même temps et au même lieu (Lodeesen). — J'ai vu un autre exemplaire indigène de cette espèce, pris en Juillet 1863, près Nymègue par M. van Bemmelen, et un troisième que l'on prit à Arnhem, se trouve dans la collection de notre société (de Graaf).

Sesia culiciformis L. — Ochs. II, 159. — Stauding. Stett. Ent. Zeit. 1856. Beitr. etc. n°. 121. — v. Heinem. Schm. D. I, p. 127. Un exemplaire de cet insecte, trouvé à Empen en Gueldre par feu M. van Eyndhoven, fait maintenant partie de ma collection (Lodeesen).

Psyche plumifera. — Ochs. III, p. 176, IV, p. 201. — v. Heinem. Schmett. Deutschl. u. d. Schw. I, p. 182. — J'en ai capturé un mâle, volant en plein jour dans une bruyère à Wolfhezen en Gueldre, le 18 Avril 1864 (P. C. T. Snellen).

Leucania Loreyi Dup. — Herr. Schaeff. System. Bearb. der Schm. v. Europa, II, p. 233, fig. 309, 314. — Un individu[1] capturé par M. Brak à Amsterdam, en 1859, se trouve dans ma collection (P. C. T. Snellen).

---

[1] La Leucanie prise par M. Brak est très-positivement la *Loreyi* de Herrich-Schaeffer. On croit généralement que ce lépidoptère habite, en Europe, exclusivement les contrées méridionales de cette partie du monde, comme l'Espagne et la France méridionale. Cependant, dans les derniers temps, on en a récueilli quelques individus à Hambourg et en Angleterre, et je n'hésite donc plus à présent à citer cette espèce comme appartenant à la faune Neêrlandaise. Cf. *supra* page 21.

Leucania Turca L. — Treits. V, 2, 181, X, 2, 72. — v. Heinem. I, p. 424. — Récueilli abondamment, le 4 Juillet 1862, à St. Oedenrode dans le Brabant septentrional, par le fils de M. le professeur Veth de Leyde, jeune amateur, à qui je dois une couple de cette espèce (Lodeesen).

Erastria venustula Hübn. — Treits. V, 3, 264. — v. Heinem. I, p. 587. — Découvert par M. van Woerden aux environs d'Arnhem, à la fin de Mai 1864. J'en possède un mâle (P. C. T. Snellen).

Zonosoma annulata Schulz. — *Cabera omicronaria* Treits. VI, 1, 358. — Wood, fig. 527. — J'ai trouvé la chenille sur l'*Acer campestris*, en Septembre 1863, dans le bois de Scheveningue. Le papillon est éclos en Mai 1864. M. Snellen van Vollenhoven me mande qu'il a rencontré ce lépidoptère aux environs de Harlem ou de Leyde, il y a plusieurs années (P. C. T. Snellen).

Lobophora polycommata W. V. — Treits. VI, 1, 333. — Staint. Man. of Brit. Butterfl. and Moths, II, p. 94. — Une femelle a été prise à Overveen, près de Harlem le 19 Avril 1864, par M. W. J. Boogaard (Kinker).

Cidaria affinitata Steph. — Herr. Schaeff. Syst. Bearb. d. Schmett. v. Eur. III, p. 157, fig. 271, 272 ♂, fig. 319, 320 ♀; Neue Schmett. fig. 28. — v. Heinem. Schm. D. u. d. S. I, pag. 772. — L'espèce a été trouvée plusieurs fois en Hollande (méridionale et septentrionale) dans les taillis et les broussailles au voisinage des dunes maritimes [1]. L'*Affinitata*, recueillie par MM. Grebner, Kinker, Loodeesen et par moi, a été jusqu'à présent confondue par nous avec l'*Alchemillata* L. (*Rivulata* Tr.) (P. C. T. Snellen).

Eupithecia piperitata Steph. Syst. Cat., p. 146, n°. 6674. — *Obrutaria* HS. III, p. 119, 126, fig. 145, 156. — v. Heinem. I, p. 806. — *Subumbrata* Guen. Lépid. X, p. 309. — M. J. H. Albarda l'a découvert à Kuikhorne en Frise, le 5 Juillet 1863, en battant les branches d'un *Pinus sylvestris*. J'ai comparé le seul exemplaire qu'il a pris, avec des individus de l'*Obrutaria* envoyés par M. Herrich-Schaeffer lui-même (de Graaf).

---

[1] J'ai trouvé l'*Affinitata* en Hollande dans les mêmes localités, aux endroits secs où croît le *Lychnis*. La chenille vit dans les capsules de cette plante d'après M. Stainton, *Man. of Brit. Butterfl.* II, p. 80. Il paraît que la *Rivulata* est plus répandue dans la faune Neêrlandaise que sa congénère. D. G.